

대장내시경 검사 안내문

I 대장내시경 검사란

1.2cm 정도 굵기의 가늘고 유연한 관 끝에 렌즈 및 광원이 달린 굴곡성 전자내시경을 항문에 삽입하여 모니터 영상을 통해 대장의 내부를 직접 관찰할 수 있는 검사로 대장암, 대장 용종, 대장염, 치질 등 다양한 대장 병변을 진단할 수 있는 가장 정확한 검사입니다. 또한 필요한 경우 바로 병변 부위에서 조직검사를 시행하여 병리조직학적 진단을 내릴 수 있는 장점이 있습니다.

I 검사 전 주의사항

1. 항고혈압제, 항경련제를 드시는 분은 검사 당일 아침 일찍 소량의 물과 함께 약을 복용하고 오십시오.
2. 인슐린을 사용중이신 분은 전날 저녁부터 주사하지 마시고, 경구용 당뇨약도 전날 저녁부터는 복용을 중단하시고 저혈당에 대비해 검사 당일 사탕, 초콜릿, 또는 오렌지 주스 등을 준비하십시오.
3. 검사 당일 용종제거술이 시행될 수 있으므로 **항응고제(와파린/쿠마딘)나 항혈소판제(아스피린, 플라빅스 등)**를 복용중이신 분은 처방받은 주치의와 약복용 중단에 대해 상의하신 후 검사 1주일 전부터 복용을 중단해 주십시오.
4. 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대, 부정맥 등이 있으신 분은 검사 전 미리 말씀해 주십시오.
5. 이 외에도 다른 질환(심장, 호흡기, 간, 신장, 알레르기 등)이 있으신 분은 예약 전에 미리 말씀해 주십시오.
6. 수면내시경을 하시는 분은 당일 자가운전이 불가능하므로 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
7. 검사 전날 저녁부터 아침까지 물변이 나오며 당일에는 건더기 없이 소변처럼 물만 나오는 것이 정상이니 놀라지 마십시오.
8. 개인에 따라 장정결이 덜 되는 경우 추후 재검사를 하실 수도 있습니다.

I 검사과정

1. 내시경 삽입전 대장 운동 억제 및 복통 경감을 위한 약물(수면유도제, 진통제)을 주사하게 됩니다.
2. 검사 도중 자세한 관찰을 위해 대장 내로 공기를 주입하므로 복부 팽만감, 불편감, 간헐적인 복통 등이 발생할 수 있으나 검사 후 수 시간 이내에 자연 소실됩니다.
3. 검사 소요시간은 보통 15분~30분 정도이나, 병변 유무, 용종의 개수 및 상태에 따라 다소 길어질 수도 있습니다.

검사 후 주의사항

1. 검사시 공기 주입으로 변이나 통증을 느낄 수 있습니다. 변기에 앉아 아랫배를 마사지하고, 많이 걸으면서 가스를 배출하는 것이 좋습니다. 더운물 주머니를 복부에 대는 것이 도움이 될 수 있습니다.
2. 검사 당일에 많이 먹거나 자극적인 식사를 할 경우 복통을 유발할 수 있으니 주의하십시오.
3. 용종절제술 후 7일간은 비행기 탑승을 삼가하여 주십시오.